

There are no translations available.



Według oceny rzeczoznawców terenowych w kraju do zaorania kwalifikowało się jedynie ok. 1% powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz ok. 2% rzepaku i rzepiku ozimego. Tak wynika ze wstępnej oceny przezimowania upraw ozimych w 2013 roku przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny – informuje serwis Farmer.pl. Decydujący wpływ na planowanie plantacji upraw ozimych będą miały warunki agrometeorologiczne w okresie dalszej wegetacji.

Największe straty w powierzchni sięgające około 3% powierzchni plantacji zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku ozimego odnotowano w województwach: zachodniopomorskim i wielkopolskim oraz mazowieckim. W tych samych regionach zaobserwowano nieznaczne szkody zimowe w uprawach koniczyny i poplonów ozimych.

- Z uwagi na opóźnioną wiosnę przewiduje się zwiększenie powierzchni zasiewów głównie kukurydzy, jęczmienia jarego, a także powierzchni uprawy ziemniaków. Terminy agrotechniczne dla siewu kukurydzy i jęczmienia jarego oraz sadzenia ziemniaków są nieco późniejsze - podaje GUS.

Jak ocenili rzeczoznawcy, rośliny w stan zimowego spoczynku jesienią 2012 r. weszły prawidłowo wyrosnięte i rozkrzewione. Niezbyt sprzyjające warunki agrometeorologiczne w zimie i na przedwiośniu nie spowodowały jednak na ogół większych strat w uprawach ozimych.

- W badanych próbach polowych udział roślin żywych i nasion kielkujących wyniósł w bieżącym roku dla pszenicy ozimej - 93,7% (o 2,5 pp. więcej niż w roku ubiegłym), dla żyta - 92,3% (o 4,1 pp. więcej), dla jęczmienia ozimego - 94,9 % (o 3,1 pp. więcej), dla pszenżyta ozimego - 91,6%. (o 4,6 pp. więcej), a dla rzepaku i rzepiku ozimego - 85,3 proc. (o 1,4 pp. więcej niż w roku ubiegłym) - poinformował GUS.

źródło: Farmer.pl